BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 27 mai 1903.

Présidence de M. F. HENNEGUY.

Nécrologie. — M. l'Archiviste Bibliothécaire annonce le décès de M. Prosper Léveillé, son oncle, qui fit partie de la Société, il y a environ 30 ans. Il a laissé la réputation d'un chasseur entomologique de premier ordre et c'est à lui que l'on doit, sinon la découverte de *Sympiezocera Laurasi,* précédemment signalée par le Dr Marmottan, à Fontainebleau, mais la connaissance complète des mœurs de ce rare insecte, qu'il a, le premier, réussi à élever de larve.

Correspondance. — M. le Dr marquis J. Rangoni remercie la Société de son admission.

Conseil. — Le Président annonce à la Société que, dans sa réunion du 18 mai dernier, son Conseil a examiné et rejeté la pétition de M. Ph. Wytsman tendant à faire souscrire la Société entomologique au « *Genera insectorum* ».

Distinction honorifique. — Parmi les croix décernées à l'occasion de l'Exposition d'Hanoï, notre collègue, M. L. de Larminat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Changement d'adresse. — M. le colonel Charles Swinhoe, 7, Gloucester Walk, Campden Hill, London W. (Angleterre).

Admissions. — M. Marcel Balestre, étudiant en Droit, villa Nordi, Menton (Alpes-Maritimes). *Lépidoptères.*

— M. Gorges Bénard, préparateur adjoint au Laboratoire d'Entomologie du Muséum, 67, rue Victor-Hugo, Levallois-Perret (Seine). *Lépidoptères et Coléoptères.*

Excursion entomologique. — M. le Président propose aux membres de la Société entomologique un projet d'excursion dans les ré-

gions avoisinant l'embouchure de la Loire, à l'occasion du Congrès de l'Association française qui aura lieu à Angers, dans le courant de la première semaine d'août. Cette proposition est mise aux voix et adoptée en principe.

Observations diverses.

Observation biologique. — Au sujet de la note de M. J. Sainte-Claire Deville sur la présence du *Stephanopachys linearis* Kug. en Corse (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1902], p. 332), M. P. Lesne dit que son attention a été attirée depuis plusieurs années sur deux exemplaires de cette espèce faisant partie de la collection de Marseul et étiquetés « Porto Vecchio ». Cette localité lui avait paru peu certaine. Plus récemment, M. Lesne a vu un troisième individu provenant de Corse dans la collection V. Mayet.

Communications.

Description d'une *Raymondia* nouvelle de la Kabylie [Col.]

par le Dr A. Chobaut.

Raymondia auripes, n. sp. — Cylindrique quand on l'examine de face, déprimé en dessus quand on le voit de profil, allongé, assez étroit, avec le prothorax et les élytres séparément un peu renflés, brillant, d'un rouge ferrugineux. Tête brillante, avec quelques points si fins qu'on la dirait lisse. Rostre épais, presque droit, un peu plus court que le pronotum, avec quelques stries formées de points allongés, fins et en ligne; hérissé en dessus de quelques poils courts et en dessous de poils allongés, dorés. Antennes testacées, pubescentes, le scape remontant jusqu'à la tête, la massue forte, bien dégagée. Prothorax beaucoup plus long que large, elliptique, aussi atténué en avant qu'en arrière, ayant sa plus grande largeur au milieu des côtés, sans carène ni ligne élevée sur le milieu, avec de gros points non disposés en série, espacés sur le disque, rapprochés jusqu'à se toucher sur les côtés; largement rebordé à la base; hérissé de poils courts, dirigés en avant. Élytres bien plus larges que le prothorax, elliptiques, ayant leur plus grande largeur à l'union du premier tiers avec le deuxième, brusquement infléchis en dessous vers l'extrémité, avec huit rangées de gros points sur chacun d'eux, ces points presque effacés au niveau de l'angle d'inflexion, les intervalles plans, sauf celui placé entre la

6e et la 7e rangée de points qui constitue une crête saillante à partir de laquelle l'élytre est replié en dessous; 7e et 8e rangées de points placées sur l'épipleure qui se creuse, vers le bout, de deux stries pour les recevoir; chaque point émet un petit poil court, à peine visible; ces poils sont cependant plus longs et plus fournis sur la partie infléchie de l'extrémité. Dessous concolore. Abdomen fortement ponctué. Pattes robustes; fémurs avec des poils dorés pas très abondants, sauf une frange épaisse de longs poils dorés sur le dos des cuisses postérieures: tibias biincurvés sur eux-mêmes, triangulairement explanés en dessous, surtout les postérieurs, garnis, ainsi que les tarses, d'une forte pubescence dorée, cette pubescence condensée en une frange épaisse, sur la seconde moitié de la partie inférieure des tibias postérieurs, du sommet de la partie explanée à l'extrémité.

Long., sans le rostre, 1,8 mill.

Kabylie : Bou Berak, en tamisant de la terre, sous des feuilles mortes, dans la forêt, en mai, au sommet de la montagne, en dessus de la maison forestière de l'Aïn-Tisselitz. Deux exemplaires.

Voisin de *Raymondia kabyliana* Pic, l'*auripes* s'en distingue par la tête presque lisse; par le rostre non fortement ponctué, mais simplement muni de stries fines formées de points allongés; par le prothorax plan sur le disque, sans ligne médiane plus élevée au milieu; enfin par l'abondante pilosité dorée des pattes, formant deux franges épaisses sur les pattes postérieures, l'une sur le dos des cuisses, l'autre sous la seconde moitié des jambes.

Nouveaux Anthicides provenant de l'Afrique australe [Col.]

par Maurice Pic.

Les Anthicides décrits dans cet article proviennent de Dumbrody (Colonie du Cap) et j'en dois la communication, ainsi que la possession, au Révérend O'Neil qui les a découverts.

Tomoderus microcephalus. — *Rufo-testaceus aut brunnescens, subnitidus, hispidus, humeris nullis et thorace modice constricto facile distinguendus.*

En ovale allongé, peu brillant, hispide, roux testacé, avec la tête et l'extrémité des élytres rembrunies. Tête relativement petite, bien moins large que le prothorax, subtronquée au sommet; antennes testacées, assez longues et peu épaisses; prothorax robuste, fortement et

largement dilaté-arrondi antérieurement, à peine étranglé avec le lobe postérieur assez court et un peu élargi en arrière, fortement ponctué; élytres peu larges et allongés, obliquement tronqués au sommet, à épaules nulles, fortement et irrégulièrement ponctués; pygidium un peu saillant, testacé; pattes moyennes, testacées. — Long. 2,5 mill. environ.

Espèce très distincte parmi les exotiques de cette région, rappelant par ses épaules nulles notre européen *dalmatinus* Reitt., mais avec un prothorax peu étranglé, la tête relativement petite, ce qui lui donne un aspect particulier.

Tomoderus Oneili. — *Rufo-brunneus, nitidus, modice pubescens, antennis pedibusque pallidis.*

Assez large, brillant, modérément pubescent, brun roussâtre avec le prothorax un peu plus clair, les antennes et les pattes pâles. Tête assez large, non diminuée derrière les yeux, subtronquée au sommet; antennes pâles, assez épaisses, élargies à l'extrémité; prothorax presque lisse, à lobe antérieur large et dilaté-arrondi, le postérieur étant peu plus court et un peu moins large que l'antérieur; élytres larges et assez courts, à épaules marquées mais arrondies, subtronqués au sommet, fortement ponctués, la ponctuation presque régulièrement disposée en lignes près de la suture; pattes pâles, robustes. — Long. 2,5 mill.

Voisin de *natalensis* Pic, moins robuste, avec la tête plus carrée derrière les yeux; moins robuste que *ovipennis* Fairm., avec la tête tout autre.

Anthicus bisbipartitus Pic [1] var. **Oneili**. — Entièrement testacé, parfois avec la tête rembrunie.

Anthicus (Aulacoderus) mediofasciatus. — *Rufo-testaceus, nitidus, oculis, antennarum clava, elytrorumque fascia mediali nigris.*

Roux testacé, brillant, avec les yeux, l'extrémité des antennes et une fascie élytrale médiane noirs, pubescent de gris. Tête très arquée derrière les yeux; antennes moyennes, testacées, à massue de trois articles, celle-ci légèrement foncée; prothorax court et large, très dilaté et subarrondi en avant, non étranglé et peu étroit à la base avec un faible sillon transversal, très pubescent latéralement; élytres ovalaires, convexes, à épaules marquées mais arrondies, subarrondis au sommet, distinctement ponctués, ornés d'une fascie médiane foncée, courte et droite; pygidium un peu saillant et rembruni; pattes grêles et testacées. — Long. 2 mill.

(1) Décrit dans un mémoire envoyé depuis longtemps à l'impression.

Rappelle un peu *amplus* Pic, mais moins robuste et coloration plus uniforme; plus large que *mutatus* v. *transversus* Pic, avec le prothorax moins brillant, non étranglé devant la base.

Ctenistomorphus elaniticus n. sp. et *Sognorus Peyerimhoffi* n. sp. [Col. Psel.]

par A. Raffray.

Ctenistomorphus elaniticus, nov. spec. — *Oblongus, antrorsum attenuatus, castaneus, elytris paulo dilutioribus, disperse et tenuiter squamoso-setosus. Caput oblongum, sat convexum, antice magis et postice minus attenuatum, tuberculo antennario cordato, leviter diviso, temporibus oblique rotundatis et dense glanduloso-squamosis, fronte tenuiter sulcata. Oculi magni. Palpi validi, crassi, articulis 2 angulato, 3 transversim ovato, 4 ovato, istis tribus longe appendiculatis. Antennae elongatae, mediam partem elytrorum superantes, articulis 1, 2 quadratis, 1 multo majore, 3-7 obconicis, latitudine sua fere duplo longioribus, 8 fere transverso, 9 crassiore, subcylindrico, septimo longiore, 10 cylindrico, leviter sinuato, praecedente plus quam duplo longiore, 11 simili, attamen apice nonnihil incrassato et obtuse acuminato. Prothorax convexus, subconicus, latitudine sua maxima vix longior, lateribus medio perparum rotundatus, postice angulis et fovea media inconspicua dense glanduloso-squamosis. Elytra latitudine sua longiora, postice leviter ampliata, lateribus leviter obliqua, humeris obliquis, basi bifoveata, stria dorsali parum profunda, arcuata, ad apicem evanescente. Abdomen elytris brevius, segmentis dorsalibus 2 primo dimidio majore. Metasternum convexum, postice juxta coxas posteriores impressum. Pedes elongati, femoribus parum crassis, tibiis rectis, apice leviter incrassatis.* ♀. — Long. 2,80 mill.

Qala'at el Aqabah; nord du golfe élanitique (golfe d'Aqabah).

Cette espèce est très voisine de *major* Raffr. d'Abyssinie : le prothorax est un peu moins arrondi sur les côtés et, dans le même sexe, les antennes sont différentes : les articles 3-7 sont plus obconiques, moins cylindriques, 8 un peu obconique est beaucoup plus court, presque transversal, tandis qu'il est encore plus long que large dans *major*, 9 est un peu plus épais que les adjacents, 10 et 11 sont proportionnellement plus grêles et plus longs. Malheureusement le mâle est inconnu; il doit avoir les antennes assez fortement sinueuses et probablement un des articles de la massue un peu irrégulier.

Un seul exemplaire, que M. de Peyerimhoff a eu la générosité de m'abandonner.

Sognorus Peyerimhoffi, nov. spec. — *Breviter oblongus, ferrugineus, elytris pedibusque dilutioribus, albido-squamosus. Caput subelongatum, subtriangulare, antice attenuatum, tuberculo antennario subtransversim cordato, foveis tribus minutis quarum anteriore oblonga, temporibus glanduloso-fasciculatis. Oculi magni. Palpi crassi, articulis 2 incrassato et angulato, 3 breviter transversim ovato, 4 graciliore, ovato, acuminato, tribus longe appendiculatis. Antennae crassae, articulis 1 quadrato, 2 angustiore, quadrato-elongato, 3-6 breviter obconicis et longitudine crescentibus, 7 sexto fere dimidio longiore, subconico, 8 quadrato, 9 praecedente duplo majore breviter ovato, fere subquadrato-rotundato, 10 simili, sed paulo majore et magis quadrato, 11 decimo fere duplo longiore, subcylindrico, apice acuminato. Prothorax latitudine sua haud longior, antice attenuatus, lateribus leviter rotundatus, angulis posticis et medio basi glanduloso-squamosus, fovea media sulciformi. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi parum attenuata, lateribus leviter obliqua, humeris oblique rotundatis, stria dorsali integra et fere recta. Abdomen elytris paulo brevius, segmento 2 dorsali primo haud dimidio majore. Metasternum sulcatum. Femoribus parum crassis, tibiis subrectis, apice incrassatis.* ♀. — Long. 1,80-2,00 mill.

Bosra d'Édom (Bou-Seira). Palestine.

Cette espèce est certainement voisine du *calcaratus* Saulcy dont je ne connais que le mâle, tandis que la femelle seule de cette nouvelle espèce est connue. La tête est plus allongée, avec des fossettes moins grandes, les antennes sont plus épaisses, mais il est difficile de comparer cet organe sur deux sexes différents chez les *Ctenistini;* le prothorax est plus obconique est bien moins arrondi; chez *calcaratus* les élytres et l'abdomen sont plus arrondis et la strie dorsale est nettement arquée, la coloration est plus sombre et plus uniforme.

Dans *Heydeni* Reitter d'Amasia, dont la femelle seule est également connue, les antennes sont beaucoup plus grêles, les articles 9 et 10 très peu développés, tandis que le 11me est brusquement beaucoup plus gros; *Heydeni* ressemble du reste beaucoup plus, comme faciès, à *calcaratus*. On ne peut comparer *Peyerimhoffi* à *Croissandeaui* Reitt. de Turcomanie, cette dernière espèce est plus svelte et les antennes sont longues et grêles, tout en gardant le caractère distinctif des *Sognorus*.

Note additionnelle sur l'habitat du *Platysma femoratum* Dj. [Col.]

par l'abbé A. Carret.

La dispersion de cette espèce en dehors de la région montagneuse des Cévennes et du Massif Central, où on l'avait crue cantonnée jusqu'à ces dernières années, est aujourd'hui un fait bien prouvé. Sa présence est actuellement reconnue et bien établie dans deux de nos départements de la rive gauche du Rhône : la Drôme et l'Isère.

Dans la Drôme, la station du *P. femoratum* est la forêt de Saou. Je la rappelle ici, non point que je prétende vouloir confirmer ce que nous en a si bien dit notre ami et savant collègue de Montpellier dans le n° 7 du présent *Bulletin*, mais parce que je crois utile d'attirer l'attention sur l'insecte lui-même.

Les individus de la forêt de Saou sont notablement plus grands et plus allongés que ceux des Cévennes ou des monts d'Auvergne; ils ont le pronotum plus longuement sinué sur les côtés, au-devant de la base, avec les angles postérieurs plus vifs et plus saillants en dehors. Ils paraissent constituer une race locale qui répond bien au type *femoratum* Dej., tandis que ceux-ci représentent mieux le type du *rufipes* du même auteur. Je n'ai pas vu un assez grand nombre d'exemplaires de l'espèce localisée à Saou pour constater la valeur de ce caractère distinctif; mais, s'il était reconnu qu'il est constant, il y aurait lieu, ce me semble, de le signaler en inscrivant dans les futurs Catalogues le *femoratum* comme var. du *rufipes*. Je maintiendrais ce dernier comme espèce typique, parce qu'il est d'emblée le plus répandu.

Dans l'Isère, la station du *P. femoratum* est au lieu dit *bois de Cornavent*, situé aux portes de Vienne. Elle a été découverte par nos amis, MM. Falcoz et Perret, deux coléoptéristes viennois pleins d'ardeur, qui chassent avec intelligence et font chaque année de nombreuses et intéressantes découvertes dans un périmètre plus ou moins étendu autour de leur ville. Ils prennent communément le *P. femoratum* dans la localité en question. Comme taille et forme générale, les individus qui s'y prennent sont indentiques à ceux du Mont-Pilat et de toute la région des Cévennes. Le bois de Cornavent n'est qu'à 300 mètres d'altitude; c'est probablement la station la moins élevée où cet insecte puisse se prendre.

Il n'y a pas de doute que l'espèce en question ne soit d'origine cévénole et que sa présence à Cornavent, aussi bien qu'à Saou, ne soit adventive. Elle a été entraînée, au moment d'une crue, par les nombreux

et torrentueux cours d'eau qui se précipitent des Cévennes au Rhône et a franchi le fleuve sur les débris apportés par la crue. Une fois débarquée sur la rive gauche, elle a remonté les pentes jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un sol humide et ombragé, car l'insecte est hygrophile et sylvicole.

Bulletin bibliographique.

Belon (R. P.) : Notes sur le genre *Alletretia* Bates, Longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1903, 8 p.*

Brölemann (H.-W.) : Matériaux pour servir à une Faune des Myriapodes de France (*Feuille J. Nat.*), 1902, 8 p., fig.*

Ducke (A.) : Die Stachellosen Bienen (*Melipona* Ill.) von Para (*Zool. Jahrb.*), 1902, 46 p., 1 pl., fig.*

Germain (P.) : Apuntes entomológicos, 1° Los Longicornios Chilenos; 1-6, 1897-1901, 3 pl. n. — 2° Heloforidos Chilenos; 1902, 24 p., 3 pl. n. — 3° El jénero *Cyphonotus;* 1897, 15 p. — 4° El jénero *Phytoloema;* 1901, 21 p., 1 pl. n. — 5° Datos sobre el jénero *Cnemalobus* (Guérin), descripcion de las de sus especies halladas en Chile por el autor; 1901, 20 p. — 6° Agrupacion de los Taurocerastidae; 1897, 16 p., 1 pl. n. — 7° El jénero *Phansdesta;* 1898, 10 p., 1 pl. n. — 8° El jénero *Oryctomorphus* (Guérin); 1901, 27 p., 1 pl. n. — 9° El jénero *Brachidia;* 1897, 12 p. — (*An. Un. Chile*).*

Id. : Apuntes sobre los Insectos de Chile. — 1° Gen. *Pteroderes;* 1894, 14 p., 1 pl. n. — 2° *Lophotus Delfini;* 1893, 11 p. — 3° Los *Carabus* Chilenos; 1895, 59 p., 1 pl. n. — 4° Estudios i descripcion de los Listroderitos de Chile i tierras magallánicas de la coleccion del Museo nacional i de la de Don Fernando Paulsen; 1-4, 1895-1897, 5 pl. n. (*loc. cit.*).*

Goeldi (E.-A.) : Os Mosquitos no Pará; Belem, 1902, 57 p.*

Maglio (C.) : Primo elenco d'idrachne del pavese (*R. Ist. lomb. Sc. Lett.*), 1903, 9 p. — Don de M. L. Bedel.

Puton (Dr A.) : Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique, 4e édit. (*Rev. Ent.*), 1899, 121 p. — Don de M. A. Fauvel.

A.-L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.